

DISPOSITIVO INTRAUTERINO O DIU



Lo utiliza la mujer.



El dispositivo intrauterino o DIU es un pequeño aparato en forma de T que se coloca dentro del útero.



El DIU evita que los espermatozoides lleguen al óvulo. De esta manera, evita el embarazo.



Es de larga duración, dura 10 años si es de cobre y 5 años si es hormonal.



El DIU es seguro para evitar el embarazo.




El DIU no protege contra las infecciones de transmisión sexual.



El personal médico es quien coloca el DIU. Está disponible en los servicios de salud y de planificación familiar. Se necesita de revisión médica cada año.



Al desear un embarazo se puede retirar.



IMPLANTE HORMONAL



Lo utiliza la mujer.



El implante hormonal es un pequeño tubo flexible que se coloca debajo de la piel del brazo.



El implante hormonal evita la ovulación, es decir, que el óvulo no sale del ovario y, así, no entra en contacto con los espermatozoides. También espesa el moco cervical, impidiendo la entrada de los espermatozoides al útero. De esta manera, evita el embarazo.



Es de larga duración, de 3 a 5 años, según el producto.



El implante hormonal es seguro para evitar el embarazo.




El implante hormonal no protege contra las infecciones de transmisión sexual.



El personal médico es quien lo coloca. Está disponible en servicios de salud y de planificación familiar. Se necesita de revisión médica cada año.



Al desear un embarazo se puede retirar.



INYECCIÓN ANTICONCEPTIVA



Las utiliza la mujer.



La inyección anticonceptiva se coloca en el músculo de la cadera o brazo.



La inyección anticonceptiva evita la ovulación, es decir, que el óvulo no sale del ovario y, así, no entra en contacto con el espermatozoide. También espesa el moco cervical, impidiendo la entrada de los espermatozoides al útero. De esta manera, evita el embarazo.



Es de corta duración, de uno a tres meses, según el tipo producto.



La inyección anticonceptiva es segura para evitar el embarazo, pero si se deja de administrar puntualmente hay riesgo de este. En estos casos, es mejor usar condón mientras se reinicia su uso.




La inyección anticonceptiva no protege contra infecciones de transmisión sexual.



La inyección anticonceptiva es recetada por personal médico. Puede comprarse en farmacias y están disponibles en los servicios de salud y de planificación familiar.




Al desear un embarazo se deja de administrar.



PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS



Las utiliza la mujer.



Las pastillas anticonceptivas se toman todos los días a la misma hora. Hay cajas de 21 y de 28 pastillas. Si se usa la caja de 21 pastillas, se descansan 7 días para reiniciar el tratamiento. Si se usa la caja de 28 pastillas, se continua con otra caja sin parar. El tratamiento se inicia el primer día de la menstruación.



Las pastillas anticonceptivas evitan la ovulación, es decir, que el óvulo no sale del ovario y, así, no entra en contacto con los espermatozoides. También espesa el moco cervical, impidiendo la entrada de los espermatozoides al útero. De esta manera, evita el embarazo.



Las pastillas anticonceptivas son de corta duración, ya que duran un mes si se toman todos los días.



Las pastillas anticonceptivas son seguras y evitan el embarazo, pero si se dejan de tomar hay riesgo del mismo. Si se olvida tomar la pastilla es necesario usar condón al tener relaciones sexuales.




Las pastillas anticonceptivas no protegen contra infecciones de transmisión sexual.



Las pastillas anticonceptivas se compran en farmacias y supermercados. Están disponibles en los servicios de salud y de planificación familiar.



Al desear un embarazo se dejan de tomar.



LIGADURA DE TROMPAS



Se realiza a la mujer.



Es un cirugía en la cual se cortan las trompas de Falopio para que el óvulo no pase y no encuentre a los espermatozoides. De esta manera, evita el embarazo.



Esta cirugía no afecta el deseo y placer sexual.



Es de duración permanente, es decir, dura para toda la vida.



La ligadura de trompas es segura, en especial, si se cortan las trompas de falopio y no solo se ligan.




La ligadura de trompas no protege contra infecciones de transmisión sexual.



El personal médico es quien realiza esta cirugía.



Con este método ya no se puede tener un embarazo.



VASECTOMÍA



Se realiza al hombre.



Es un cirugía en la cual se cortan los conductos deferentes para que los espermatozoides no lleguen al semen que se eyaculará. Así, el semen que llega al útero no lleva espermatozoides que puedan fecundar al óvulo. De esta manera, evita el embarazo.



Esta cirugía no afecta el deseo y placer sexual, tampoco la erección y la eyaculación.



Es de duración permanente, es decir, dura para toda la vida.



La vasectomía es segura.




La vasectomía no protege contra infecciones de transmisión sexual.



El personal médico es quien realiza esta cirugía.



Con este método ya no se puede tener un embarazo.



CONDÓN O PRESERVATIVO



Lo utiliza el hombre.



El condón es una bolsita de látex o poliuretano que se coloca en el pene erecto desde el inicio de la relación sexual hasta que esta termina.



El condón guarda el esperma eyaculado, entonces los espermatozoides no entran a la vagina. De esta manera, evita el embarazo.



El condón es de corta duración, pues dura lo que dura la relación sexual.



El condón es seguro para evitar el embarazo. Para cada relación sexual se debe usar un condón nuevo y jamás se deben usar dos condones al mismo tiempo, porque habrá riesgo de embarazo.




El condón es el único método anticonceptivo que protege de las infecciones de transmisión sexual.



Los condones se compran en farmacias, tiendas y supermercados. Están disponibles en los servicios de salud y de planificación familiar.



Al desear un embarazo se deja de usar.



ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA



La usa la mujer que fue víctima de violación sexual.



La anticoncepción de emergencia puede ser la píldora anticonceptiva de emergencia o el dispositivo intrauterino de cobre (DIU de cobre).



Cualquiera de los dos debe aplicarse de inmediato y hasta 72 horas después de la violación sexual.



Mientras más rápido se tomen las píldoras de anticoncepción de emergencia o se coloque el DIU de cobre, mayor es su eficacia.



La anticoncepción de emergencia no protege de las infecciones de transmisión sexual.



Su uso es en caso de emergencia.



La píldora anticonceptiva de emergencia puede comprarse en una farmacia, y está disponible en los servicios de salud para casos de violación sexual. El DIU de cobre debe ser colocado por personal médico.



La anticoncepción de emergencia no se usa para planificación familiar, no es abortiva y no funciona si hay embarazo.