

VERDAD

O

MENTIRA

**Las pruebas de VIH o de ITS
deben ser confidenciales.**

VERDAD

Para prevenir las ITS de mejor manera, el condón se usa en las prácticas sexuales por vagina, ano o boca.

VERDAD

**El condón solo se puede
usar una vez porque es
desechable.**

VERDAD

**El condón se puede romper
cuando no se le saca el aire,
apretando la punta con los
dedos, al colocarlo en el
pene erecto.**

VERDAD

**Los métodos anticonceptivos
naturales no protegen de las
ITS ni del VIH.**

VERDAD

**Usar condón desde el inicio
de la relación sexual nos
protege de las ITS.**

VERDAD

**La hepatitis B
es una ITS.**

VERDAD

**Las ITS se transmiten de una
persona a otra durante las
relaciones sexuales.**

VERDAD

**Si la mujer está embarazada
y tiene alguna ITS, la puede
pasar al feto durante el
embarazo o al bebé al
nacer.**

VERDAD

**La clamidia y la gonorrea
son ITS que, si no se tratan
médicamente a tiempo,
pueden causar esterilidad.**

VERDAD

La sífilis y el VIH son ITS que, si no se tratan médicamente a tiempo, pueden causar la muerte.

VERDAD

El herpes genital y el virus del papiloma humano (VPH) son ITS que, si no se tratan médicamente a tiempo, pueden causar algún tipo de cáncer.

VERDAD

**EL zika
es una ITS.**

VERDAD

Las llagas o bultitos en el pene, la vulva, la boca, el ano o áreas cercanas a estos pueden ser síntomas de alguna ITS.

VERDAD

**Las secreciones con mal olor
o con un color raro
que salen del pene o la
vagina son síntomas de
algunas ITS.**

VERDAD

**Algunas ITS se transmiten
por contacto de piel a piel,
como el herpes genital, el
virus del papiloma humano,
la sarna y la infección
por ladillas.**

VERDAD

**El flujo vaginal con mal olor
puede ser signo de ITS.**

VERDAD

**Una persona puede vivir
con VIH por años sin tener
síntomas y desarrollar SIDA.**

VERDAD

**La víctima de violación
sexual puede quedar
infectada de alguna ITS
y de VIH por su violador.**

VERDAD

Lo mejor es no tener relaciones sexuales si sospechamos o sabemos que nuestra pareja sexual padece alguna ITS y no se ha tratado médicamente.

VERDAD

**Las ITS no se pueden
prevenir.**

MENTIRA

Las mayoría de las ITS
se pueden prevenir usando condón
desde el inicio de la relación sexual.

**Las ITS solo afectan a los
hombres.**

MENTIRA

Los hombres y las mujeres
pueden tener ITS.

**Todos los métodos
anticonceptivos modernos
protegen del embarazo
y de las ITS.**

MENTIRA

El único método anticonceptivo moderno
que previene las ITS, además del embarazo,
es el condón.

**Las relaciones sexuales
durante la menstruación
evitan las ITS.**

MENTIRA

Solo el uso de condón desde el inicio de la
relación sexual previene las ITS.

**Las ITS se evitan lavándose
bien la vulva o el pene
después de la relación
sexual.**

MENTIRA

Lavar los órganos sexuales
no evita las ITS ni el VIH.

Solo el uso de condón, desde el inicio
de la relación sexual, las puede prevenir.

**El VIH y el SIDA
son lo mismo.**

MENTIRA

El VIH y el SIDA no son lo mismo.
El VIH es el virus que causa el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida o SIDA.
Se puede tener VIH sin desarrollar la
enfermedad.

**Es fácil ver si una persona
tiene ITS.**

MENTIRA

Algunas personas no presentan síntomas de ITS, es decir, son asintomáticas.
Para confirmar o descartar las ITS se necesita examen médico y análisis de laboratorio.

**El sangrado poco común,
el dolor durante las
relaciones sexuales y el
ardor o dolor al orinar
no son síntomas de ITS.**

MENTIRA

Uno o los tres síntomas pueden aparecer si se tiene alguna ITS, por eso hay que visitar un servicio de salud para examen médico y análisis de laboratorio.

**La sarna y la infección
causada por ladillas
no son ITS.**

MENTIRA

Ambas son ITS y su transmisión es
por contacto de piel a piel.

**Las parejas estables
no contraen ITS, por eso no
usan condón.**

MENTIRA

Alguna de las personas puede haber adquirido la ITS antes de estar con la nueva pareja, o por relaciones sexuales fuera de la pareja, o por transfusión de sangre, o al hacerse un tatuaje, o por compartir objetos contaminados. Solo el uso de condón desde el inicio de la relación sexual previene las ITS.

**En la primera relación sexual
nunca se contrae el VIH,
por eso no se usa condón.**

MENTIRA

Sin uso de condón, el riesgo de infección por VIH es alto si la otra persona tiene VIH. La única forma de saber que la otra persona no tiene VIH es a través de examen médico y análisis de laboratorio.

**Las personas que se ven
sanas y fuertes no tienen ITS.**

MENTIRA

Cualquier persona puede infectarse y
transmitir las ITS, incluido el VIH.
La única forma de saber que la otra persona
no tiene ITS o VIH es a través de examen
médico y análisis de laboratorio.

**No usar condón es una
prueba de amor.**

MENTIRA

El amor no se mide de esta manera.
Usar condón es una prueba
de que el hombre cuida su salud
y la de su pareja sexual.

**La mujer no puede llevar
condones y proponerle a su
pareja que los use.**

MENTIRA

Tanto hombres como mujeres pueden llevar consigo los condones y proponer su uso. Lo importante es usar condón desde el inicio de la relación sexual, y no quien los lleva o propone su uso.

**Colocar dos condones
es más seguro para prevenir
las ITS y el VIH.**

MENTIRA

Usar dos condones hará que se rompan
y no se podrán evitar las ITS ni el VIH.

**Las cremas para las manos
o la cara y los aceites de
bebé o de cocina
sirven para lubricar cuando
se usa condón.**

MENTIRA

Estas cremas y aceites
pueden romper el condón.

Los lubricantes que se usan durante las
relaciones sexuales deben ser a base de
agua. Si no se tienen, se puede usar la saliva.

**Las mujeres trans
padecen más de ITS.**

MENTIRA

Cualquier mujer, sin importar su identidad de género o prácticas sexuales, puede infectarse y transmitir las ITS.

La única manera de evitar las ITS es usando condón desde el inicio de la relación sexual.

**El VIH solo afecta a los
hombres homosexuales.**

MENTIRA

Cualquier hombre o mujer, sin importar su orientación sexual o actividad sexual, puede infectarse y transmitir el VIH.

Quienes tienen más probabilidad de infectarse de VIH son las personas que no usan condón.

**Las ITS afectan solo a
trabajadoras/es sexuales
y a personas con varias
parejas sexuales.**

MENTIRA

Cualquier persona, sin importar su trabajo o el número de parejas sexuales, puede infectarse y transmitir las ITS.

La única forma de prevenir la infección y transmisión de las ITS es usando condón desde el inicio de la relación sexual.

**Las lesbianas
no tienen ITS ni VIH.**

MENTIRA

Cualquier mujer, sin importar su orientación sexual o prácticas sexuales, puede infectarse y transmitir las ITS y el VIH.

La única forma de saber que las personas no tienen alguna ITS es a través de examen médico y análisis de laboratorio.